

Informovaný súhlas pred anesteziologickým výkonom

Celková anestézia (narkóza) je stav riadeného bezvedomia, podobný pokojnému spánku. Anestézii predchádza predoperačná príprava a podanie premedikácie – ich úlohou je znížiť možnosť vzniku komplikácií. Samotná anestézia sa začína podaním liekov do žily alebo vdychovaním anesteziologických plynov cez tvárovú masku. Pri intubačnej anestézii sa kyslík a anestetické plyny podávajú pomocou špeciálnej trubice, ktorú anesteziológ zavedie do priedušnice hneď potom ako zaspíte. Intubácia zabezpečuje veľmi spoľahlivé zaistenie dýchacích ciest a umelé dýchanie. Pri stomatologickom výkone dýchaciu trubicu zavádza anesteziológ cez nos, aby nezavadzala stomatológovi pri ošetrovaní zubov. V súčasnosti sa počas narkózy podávajú presné dávky anestetických látok a používajú sa citlivé monitory na sledovanie životných funkcií.

Každý spôsob anestézie má svoje výhody, nevýhody a riziká. Anesteziológ Vám navrhne taký spôsob, ktorý je najvhodnejší pre typ vašej operácie a Váš celkový zdravotný stav.

Ambulantná anestézia umožňuje, aby bol pacient v deň operácie o niekoľko hodín prepustený do domácej starostlivosti. Pacient na zákrok musí prísť v sprievode dospeléj osoby. Pacient je po zákroku v sprievode dospeléj osoby odvezený do domáceho prostredia osobným motorovým dopravným prostriedkom. Dospelá osoba bude poučená o starostlivosti o pacienta po narkóze a musí byť prítomná pri pacientovi 24 hod. po nej.

Všetky odchýlky od bežného stavu po narkóze musí nahlásiť ošetrojúcemu lekárovi na poskytnutom telefónnom čísle.

- Do 36 hodín po narkóze nesmie pacient šoférovať, pracovať vo výškach, obsluhovať stroje a nemal by podstupovať žiadne právne úkony.
- Plánovaný operačný výkon v narkóze môže pacient podstúpiť, iba ak nemá akútnu infekciu a liečenie poslednej infekcie ukončil aspoň pred 3 týždňami.
- Je bežné, že po dobu 1 týždňa po výkone sa rýchlejšie unavíte.
- Niekoľko dní Vás môže obťažovať škriabanie v krku, bolesť hlavy, svalov a operačnej rany.
- Pri náhlej zmene polohy, môžete pociťovať závrat.
- Niekoľko dní môžete mať zníženú emočnú stabilitu.
- Do 24 hod. po výkone býva častejšie bolesť hlavy a pocit na zvracanie.

Bol som poučený/á o predoperačnej príprave, o priebehu celkovej anestézie a pooperačnej starostlivosti, o možných komplikáciách, o nutnosti hospitalizácie v prípade vážnych komplikácií.

Súhlasím s prevedením ambulantného výkonu v celkovej anestézii.

Prehlasujem, že v dotazníku som uviedol pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pred operáciou v celkovej anestézii.

Zaväzujem sa, že dodržím všetky pokyny uvedené v informačnom liste.

Po prepustení do domácej starostlivosti som zodpovedný sám za svoje zdravie a život. V prípade komplikácií budem ihneď informovať anesteziológa alebo ošetrojúceho lekára.

V Košiciach dňa

Podpis lekára

Podpis pacienta

Poučenie pred a po celkovej anestézii

1. Nejedzte a nepite 6-8 hodín pred operáciou (prevencia zvracania a vdýchnutia zvratkov), deň pred operáciou jedzte len ľahko stráviteľné jedlá.
2. Aspoň 6 hodín pred operáciou nefajčite.
3. Deň pred operáciou nepite alkoholické nápoje.
4. Vyberte si zubné protézy a kontaktné šošovky.
5. Pri ambulantnej anestézii si zabezpečte doprovod dospelaj osoby a jej prítomnosť v domácnosti na 24 hodín po výkone.
6. Do 36 hodín po výkone sa zakazuje riadenie motorového vozidla.
7. Do 36 hodín po výkone je prísny zákaz fajčenia a pitia alkoholu, užívajte len lieky, ktoré schválil anesteziológ.
8. Po dobu 1 týždňa po výkone si neplánujte náročné pracovné povinnosti a fyzické námahy.